


Brustkrebssterblichkeit bei Frauen in Deutschland

Quelle: Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes:
 Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (C50)

Grafik: Brustkrebssterblichkeit (Frauen)

| Jahr | Geschlecht | |
|------|------------|-----------|
| | weiblich | insgesamt |
| 1999 | 17.616 | 17.798 |
| 2000 | 17.814 | 18.035 |
| 2001 | 17.504 | 17.737 |
| 2002 | 17.780 | 18.010 |
| 2003 | 17.173 | 17.437 |
| 2004 | 17.592 | 17.768 |
| 2005 | 17.455 | 17.700 |
| 2006 | 17.286 | 17.553 |
| 2007 | 16.780 | 17.029 |
| 2008 | 17.209 | 17.345 |
| 2009 | 17.066 | 17.197 |
| 2010 | 17.466 | 17.573 |



Die ausgewählten Todesursachen ermöglichen einen zeitlichen Vergleich nach der Umstellung der ICD-Systematik (1980-1997 ICD9, ab 1998 ICD10).

'insgesamt' enthält die Angaben zu allen an Brustkrebs Gestorbenen (ICD: C50) eines Berichtsjahres in Deutschland.